



INFECTIONS URINAIRES DE LA FEMME NON ENCEINTE

FACTEURS DE RISQUES DE COMPLICATION

- Anomalie organique ou fonctionnelle connue de l'arbre urinaire
- Immunodépression grave
- Age > 75 ans ou âge > 65 ans et personne fragile
- Clairance créatininémie < 30 ml/min
- Grossesse évolutive -> cf. Mémo spécifique de la femme enceinte

CONDUITE À TENIR

Interview
Dr Jean-Philippe Joseph
Professeur de Médecine générale,
Directeur du Département de Médecine générale,
Université de Bordeaux



Les fluoroquinolones n'ont plus de place, aujourd'hui,
dans le traitement des cystites avec ou sans facteurs
de risque de complications.



CYSTITE AIGÜE SIMPLE

DIAGNOSTIC

Brûlures et douleurs à la miction et/ou pollakiurie et/ou impériosité mictionnelle, hématurie macroscopique (fréquente, environ 30 % des cas).

Absence de facteur de risques de complication

EXAMEN

La bandelette urinaire (BU) est positive (leucocytes positifs et/ou nitrites positifs).

TRAITEMENT

1^{ère} intention

Fosfomycine-trométamol 3g dose unique

2^{ème} intention

Pivmécillinam 400 mg 2 fois/jour sur 5 jours

Les posologies journalières sont indiquées pour un adulte de poids normal à fonction rénale normale.



CYSTITE AIGÜE À RISQUE DE COMPLICATION

DIAGNOSTIC

Brûlures et douleurs à la miction et/ou pollakiurie et/ou impériosité mictionnelle, hématurie macroscopique (fréquente, environ 30 % des cas).

Présence d'au moins un des facteurs de risques de complication

EXAMEN

BU + ECBU pour identifier le traitement adapté

TRAITEMENT

Si les symptômes le permettent, le traitement sera dans l'idéal différé, permettant d'emblée de choisir la molécule la plus appropriée.

1 Traitement probabiliste

(si les symptômes ne permettent pas d'attendre l'ECBU)

1 ^{ère} intention	2 ^{ème} intention
Nitrofurantoïne 100mg 3 fois par jour sur 7 jours	Fosfomycine-trométamol 3g à J1 J3 J5

2 Traitement adapté à l'antibiogramme

(si les symptômes permettent de sursoir au traitement probabiliste ou si ce dernier était inadapté)

1 ^{ère} intention	2 ^{ème} intention
Amoxicilline 1g 3 fois par jour sur 7 jours	Pivmécillinam 400 mg 2 fois par jour sur 7 jours

La durée de traitement antibiotique mentionnée est la durée totale de traitement efficace (incluant la durée du traitement probabiliste le cas échéant). Les posologies journalières sont indiquées pour un adulte de poids normal à fonction rénale normale.

Pour les traitements de 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} intention, consultez le site antibiocllic.com

ANTIBIOCLIC.COM

OPTIMISEZ VOTRE STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

Outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, pour un bon usage des antibiotiques

À usage unique des professionnels de santé

Son contenu suit les dernières recommandations françaises en vigueur

Le contenu du site ne se substitue pas à la responsabilité de prescription du médecin.



Scannez le QR Code